






***Juglans regia L. (nogal, intxaurrondo)***

<b>FOLIACIÓN</b>				
<b>00</b>	<b>07</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
Período de reposo invernal	La yema comienza a abrirse	Borde de la hoja visible	Desarrollo total del 10% de la hojas	Desarrollo total del 50% de las hojas
				
(07,10) El estadio debe observarse por lo menos en tres ramas distintas del árbol.				
(11,15) La hoja está desarrollada cuando se observa el peciolo que separa la hoja de la rama.				
<b>FLORACIÓN</b>				
<b>55</b>	<b>61</b>	<b>65</b>		
Botones florales visibles sin abrirse	10% de flores abiertas	La mitad de la flores abiertas		
				
(55) El estadio debe observarse al menos en tres ramas distintas del árbol.				
(61,62) Las flores se consideran abiertas cuando el polen se desprende fácilmente de los amentos.				
<b>FRUCTIFICACIÓN</b>				
<b>70</b>	<b>79</b>	<b>86</b>		
Primeros frutos visibles	Los frutos han alcanzado su tamaño máximo en todo el árbol	Más de la mitad de la planta tiene frutos maduros		
				
(70) En al menos tres partes distintas del árbol				
<b>COMIENZO REPOSO VEGETATIVO</b>				
<b>92</b>	<b>95</b>	<b>97</b>		
Comienza a cambiar el color de las hojas	50% de las hojas decoloradas o caídas	Del 95 al 100% de las hojas han caído. Fin de la caída de las hojas		
