








***Ligustrum vulgare L. (Aligustre, karraskiloa)***

<b>FOLIACIÓN</b>				
<b>00</b>	<b>07</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
Período de reposo invernral	La yema comienza a abrirse	Borde de la hoja visible	Desarrollo total del 10% de la hojas	Desarrollo total del 50% de las hojas
				
(07,10) El estadio debe observarse por lo menos en tres ramas distintas del árbol.				
(11,15) La hoja está desarrollada cuando se observa el peciolo que separa la hoja de la rama.				
<b>FLORACIÓN</b>				
<b>55</b>	<b>61</b>	<b>65</b>		
Botones florales visibles sin abrirse	10% de flores abiertas	La mitad de la flores abiertas		
				
(55) El estadio debe observarse al menos en tres ramas distintas del árbol.				
(61,62) Las flores se consideran abiertas cuando los estambres son visibles.				
<b>FRUCTIFICACIÓN</b>				
<b>70</b>	<b>79</b>	<b>86</b>		
Primeros frutos visibles	Los frutos han alcanzado su tamaño máximo en todo el árbol	Más de la mitad de la planta tiene frutos maduros		
				
(70) En al menos tres partes distintas del árbol				