









Malus domestica (sagarra, manzano)

FOLIACIÓN				
00	07	10	11	15
Período de reposo invernral	La yema comienza a abrirse	Borde de la hoja visible	Desarrollo total del 10% de la hojas	Desarrollo total del 50% de las hojas
				
(07,10) El estadio debe observarse por lo menos en tres ramas distintas del árbol.				
(11,15) La hoja está desarrollada cuando se observa el peciolo que separa la hoja de la rama.				
FLORACIÓN				
55	61	65		
Botones florales visibles sin abrirse	10% de flores abiertas	La mitad de la flores abiertas		
				
(55) El estadio debe observarse al menos en tres ramas distintas del árbol.				
(61,62) Las flores se consideran abiertas cuando los estambres son visibles.				
FRUCTIFICACIÓN				
70	79	86		
Primeros frutos visibles	Los frutos han alcanzado su tamaño máximo en todo el árbol	Más de la mitad de la planta tiene frutos maduros		
				
(70) En al menos tres partes distintas del árbol				
COMIENZO REPOSO VEGETATIVO				
92	95	97		
Comienza a cambiar el color de las hojas	50% de las hojas decoloradas o caídas	Del 95 al 100% de las hojas han caído. Fin de la caída de las hojas		