













Sambucus nigra L. (saúco, intrusa beltza)

FOLIACIÓN			
00	10	11	15
Período de reposo invernial	Borde de la hoja visible	Desarrollo total del 10% de la hojas	Desarrollo total del 50% de las hojas
			
(07,10) El estadio debe observarse por lo menos en tres ramas distintas del árbol.			
(11,15) La hoja está desarrollada cuando se observa el peciolo que separa la hoja de la rama.			
FLORACIÓN			
55	60	65	
Botones florales visibles sin abrirse	Primeras flores abiertas	La mitad de la flores abiertas	
 	 	 	
(55) El estadio debe observarse al menos en tres ramas distintas del árbol.			
(61,65) Las flores se consideran abiertas cuando los estambres son visibles.			
FRUCTIFICACIÓN			
70	79	86	
Primeros frutos visibles	Los frutos han alcanzado su tamaño máximo en todo el árbol	Más de la mitad de la planta tiene frutos maduros	
 			
(70) En al menos tres partes distintas del árbol			
COMIENZO REPOSO VEGETATIVO			
92	95	97	
Comienza a cambiar el color de las hojas	50% de las hojas decoloradas o caídas	Del 95 al 100% de las hojas han caído. Fin de la caída de las hojas	